



«Регионарная анестезия в акушерстве»

Куликов Александр Вениаминович

Уральский государственный медицинский университет

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП




2014


00:57:21

Куликов А.В.






MOSBY



Maya S. Suresh
B. Scott Segal
Roanne Preston
Roshan Fernando
C. LaToya Mason

Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins




Editor
Ronald D. Miller

Lars I. Eriksson • Lee A. Fleisher
Jeanine P. Wiener-Kronish • William L. Young

International Edition


CHURCHILL LIVINGSTON

Volume 1



CHURCHILL LIVINGSTON

Ronald D. Miller
Manuel C. Pardo, Jr.




SECOND EDITION



DAVID E. LONGNECKER
DAVID L. BROWN
MARK F. NEWMAN
WARREN M. ZAPOL

Mc Graw Hill



David L. Brown

André P. Boezaart • Ursula A. Galway • Richard W. Rosenquist
James P. Rathmell • Brian D. Sites • Brian C. Spence

Fourth Edition

Куликов А.В.

00:57:22

В структуре МС от причин, связанных с анестезией преобладает общая анестезия с проблемами дыхательных путей

Метод выбора в акушерстве – регионарная анестезия (спинальная, эпидуральная, комбинированная спинально-эпидуральная)



Регионарная анестезия в акушерстве

- Регионарная анестезия определена как оптимальный метод анестезиологического пособия в акушерстве всеми ведущими медицинскими организациями мира** (World Health Organization, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO), Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland/Obstetric Anaesthetists' Association (AAGBI/OAA), American Academy of Family Physicians, American Society of Anesthesiologists (ASA), Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP), Форум «Мать и дитя», Федерация анестезиологов и реаниматологов России (ФАР)).

Материнская смертность, связанная с анестезией

1,6% от всех случаев МС в США (в России 3,7%)

Метод	1991-1996 (на 1 000 000)	1997-2002 (на 1 000 000)
Общая анестезия	16,8	6,5
Регионарная анестезия	2,5	3,8
Отношение риска 1,7		

В целом МС, связанная с анестезией уменьшилась на 60%


Hawkins JL, Chang J, Palmer SK, Gibbs CP, Callaghan WM. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979-2002. Obstet Gynecol. 2011 Jan;117(1):69-74.
Куликов А.В.

Кесарево сечение

- Швейцарский мясник Jacob Nufer в 1500 г. На кухонном столе выполнил бритвой извлечение живого ребенка. Мать умерла
- Jacques Guillimeau in 1598 впервые использовал термин “cesarean section” - «Кесарево сечение»
- Джейн Сеймур, третья жена Генри VIII, рожала в течение двух дней с медленным эффектом. Ее акушер сказал королю, что или краниотомия, или абдоминальное родоразрешение могут закончить роды.
- Король, которому остро был необходим законный наследник престола, направил врачей, чтобы “спасти жизнь ребенка, поскольку другая жена может легко быть найдена.” Джейн Сеймур умерла спустя 12 дней после рождения ее сына Эдуарда VI. 1573 г.




Рождение Эскулапа с помощью сперации кесарева сечения у умершей женщины. Гравюра на дереве из книги Allessandro Benedetti's «De re medica», изданной в 1549 г. [Gall P. L'econografia del daglio sesareo, 1936].





«Это наш долг, равно как и привилегия использовать все допустимые средства для уменьшения и устранения физических страданий матери во время родов»

J.Y.Simpson, 1848



1591

**Е.М. Calzean была сожжена без обычного
удушения перед казнью в том числе и за то,
что пыталась перенести родовую боль у
женщины на собаку при помощи колдовства**


Обезболивание в родах, как массовое повседневное мероприятие, применялось и применяется только в Советском Союзе. Для нас, советских ученых, ясно, что для успешного разрешения этой проблемы необходима углубленная научно-исследовательская работа, построенная на основе учения И. П. Павлова.

Советская женщина, активная участница великих сталинских преобразований, ждет от нас быстрейшего разрешения вопроса обезболивания в родах.


Принято на объединенной научной конференции Президиума Академии медицинских наук СССР и Ученого совета Министерства здравоохранения СССР, посвященной вопросам обезболивания в родах 30.I 1951 г.

Разумеется, мы не пойдем по пути такой «рационализации» способов обезболивания, по какому идут сейчас американские акушеры, рекламирующие в качестве «самого эффективного» новейший способ обезболивания родов с помощью длительной каудальной анестезии.

А в это время...



Whitacre needle (1951)



Cappe and Deutsch needle (1953)

А у нас...



Bainbridge needle (1900)

Куликов А.В.

Главные причины отказа от регионарной анестезии в акушерстве: незнание + мифы + страх + отсутствие отношения к женщине, как к человеку



Мультиомодальная аналгезия

Регионарная
анестезия

NMDA антагонисты

Опиаты

Антиконвульсанты

Парацетамол

Селективные
ингибиторы
ЦОГ-2

Анальгин

Трициклические
антидепрессанты

Агонисты центральных
 α -2 адренорецепторов

Нестероидные
противовоспалительные
аналгетики

Обезболивание родов



Положение 1.

До 25-30% женщин характеризуют родовую боль как сильную, чрезмерную, и соответственно боль может нанести вред, как организму матери, так и плода и новорождённого.

Положение 2.

При решении вопроса о необходимости обезболивания родов в целом необходимо руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":

«Статья 19. Право на медицинскую помощь:

5. Пациент имеет право на:...

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами».

Американское Общество Анестезиологов (ASA) и американское общество Акушеров и Гинекологов (ACOG) в совместном заявлении считают, **нет таких обстоятельств, когда женщина должна испытывать серьезную боль, поддающуюся безопасному лечению, в то время когда она находится под наблюдением врача.**

При отсутствии медицинских противопоказаний материнский запрос - достаточное медицинское показание для облегчения боли во время родов.

Чрезмерная боль в родах

- Одно из самых ярких отрицательных ощущений в жизни
- Психо-эмоциональное напряжение, страх, чувство беспомощности
- Неадекватное поведение в родах
- Дополнительная травма родовых путей
- Негативное отношение к персоналу и его рекомендациям
- Длительная послеродовая депрессия до 22% - посттравматический стресс
- Необоснованное требование операции при последующих родах
- Формирование патологической боязни родов – токофобия – 6-10%

Boudou M, Séjourné N, Chabrol H. Childbirth pain, perinatal dissociation and perinatal distress as predictors of posttraumatic stress symptoms Gynecol Obstet Fertil. 2007 Nov;35(11):1136-42.

Чрезмерная боль в родах

Гипервентиляция

Гипокапния

Респираторный алкалоз

Кривая диссоциации HbO_2 влево

Вазоконстрикция маточных
сосудов

Снижение плацентарной перфузии

Снижение поступления O_2 к плоду

Компенсаторный метаболический
ацидоз

Повышение АДГ катехоламинов,
глюкагона, СТГ, кортизола

Гликолиз Глюконеогенез

СЖК

Кетоз

Гипергликемия

Лактат – ацидоз

Вазоконстрикция сосудов

Дискоординация родовой
деятельности

ПЛОД:

Метаболический ацидоз

Гипоксемия

Нарушение ЧСС



Подготовка
к родам

Возраст

Личностные
качества

Окружающая
среда

Социально-экономический
статус

Эмоциональный
компонент

Религия


Физический
компонент
Сокращения матки
Состояние
шейки матки
Период родов

Трансдукция



Трансмиссия

Стимулы низкой
интенсивности
Стимулы высокой
интенсивности
Повреждение




Аnestетики
Опиаты
NMDA –антагонисты
Агонисты α_2 AR
Немедикаментозные методы

**Проводниковая анестезия
(эпидуральная, спинальная)
НПВС**

**Местные
анестетики**
НПВС

Опиаты
НПВС
Агонисты α_2 AR



Обезболивание родов

Нефармакологические методы

Психопрофилактика "continuous labor support»

Чрезкожная электронейростимуляция


Роды в воде,

Массаж, гимнастика,

Подкожное введение воды,

Акупунктура, Гипноз,

Ароматерапия, Аудиоаналгезия



Безопасно для плода
Низкая эффективность

Заключения экспертов по нефармакологическим методам обезболивания родов

- Поощряют активное участие женщины в процессе обезболивания.
- Поддерживают или восстанавливают женщине ощущение контроля над ситуацией.
- Имеют тенденцию к высокой оценке и желанию повторить их в будущих родах. Они вносят положительную окраску в психологический, духовный, социальный, и культурный аспекты опыта рождения.

Обезболивание родов

Наркотические аналгетики:

Морфин 5-10 мг в/м, 2-3 мг в/в

Промедол 10-20 мг в/м

Фентанил 50-100 мкг в/м, 25-50 мкг в/в

Ремифентанил 0,1 мкг/кг/мин в/в


Прочие

Буторфанол 1-2 мг

Налбуфин до 10 мг

Кетамин 15-25 мг

Нежелательно: НЛА, бензодиазепины



Ингаляционные анестетики

Закись азота/кислород 2:1,

Фторотан до 0,5 об%


Энфлюран до 0,75 об%


Изофлюран до 0,75 об%

Севофлюран до 0,75 – 1,5 об%


**Низкая эффективность
Нарушение сознания
Депрессия ЦНС и дыхания у новорожденного**


Регионарная анестезия в обезболивании родов






© 2012 CHRISTY KRAMES






A Начало первого периода



C Начало второго периода




B Первый период



D Потужной период



Интенсивность
боли



© Смирнов А.В.

Нейроаксиальная анестезия

- ✓ Эпидуральная аналгезия (болюс)
- ✓ Постоянная инфузия местного анестетика в эпидуральное пр-во (continuous epidural infusion (CEI))
- ✓ Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (combined spinal-epidural (CSE))
- ✓ Контролируемая пациенткой аналгезия (Patient-controlled epidural analgesia (PCEA))
- ✓ Продленная спинальная анестезия?




Paech M. Newer techniques of labor analgesia //Anesthesiology Clinics of North America - 2003- Vol 21, № 1 - P 1-17

Hughes D., Simmons S.W., Brown J., Cyna .M. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in labour //Cochrane Database Syst. Rev. – 2003 -(4):CD003401

Anim-Somua M., Smyth R., Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. //Cochrane Database Syst. Rev. – 2005 - Oct 19 -(4):CD000331


Основные преимущества эпидуральной аналгезии в родах

- Наиболее адекватное обезболивание при сохраненном сознании с высокой степенью удовлетворения женщины и обеспечения комфорта в родах.
- Обеспечивает минимальную фармакологическую нагрузку на плод и новорожденного.
- Устраняет дискоординацию родовой деятельности.
- Устраняет избыточную гипервентиляцию матери и изменения КОС плода.
- Снижает уровень катехоламинов в крови матери.
- Предотвращает нарушение фетоплацентарного кровотока и нарушение транспорта кислорода при чрезмерно болезненных схватках.
- Снижение объема кровопотери (в основном при операции кесарева сечения).
- Обеспечивает снижение АД.
- Снижение травмы родовых путей.
- Адекватное обезболивание при манипуляциях и операциях в III периоде родов.
- Устраняет депрессивное влияние опиатов на новорожденного



Безопасность нейроаксиальных методов обезболивания в родах складывается из:

- Компетентность анестезиолога-реаниматолога в особенностях проведения регионарной аналгезии в родах
- Компетентность акушера-гинеколога в особенностях течения родов в условиях эпидуральной аналгезии
- Современное техническое оснащение (иглы, катетеры, дозаторы, мониторы)
- Современные местные анестетики (булевакайн, ропивакайн)
- Мониторинг состояния женщины и плода




00:57:24


Куликов А.В.



Местные анестетики




Ропивакайн




	Концентрация препарата (мг/мл)	Объем раствора (мл)	Доза (мг)	Начало действия (мин)	Длительность действия (ч)
Болюс	2.0	10 - 20	20 – 40		
Многократное введение (например, для обезболивания родов)	2.0	10 – 15 (минимальный интервал - 30 мин)	20 – 30	10 – 15	1,5 – 2,5
Длительная инфузия для					
Обезболивания родов	2.0	6 - 10 мл/ч	12 – 20 мг/ч	-	-
Послеоперационного обезболивания	2.0	6 - 14 мл/ч	12 – 28 мг/ч	-	-

Бупивакайн



Тип блокады	концентрация		Доза		начало действия мин	Длительность (час)	
	%	мг/мл	мл	Мг		без адрен	С адрен
Инфильтрация	0,25	2,5	до 60	до 150	1-3	3-4	+
	0,5	5	до 30	до 150	1-3	4-8	+
Эпидуральная анестезия	0,5	5	15-30	75-150	15-30	2-3	-
	0,25	2,5	6-15	15-37,5	2-5	1-2	-
Постоянная инфузия в ЭП	0,25	2,5	5-7,5/час	12,5-18,75/час	-	-	-
Каудальная эпидуральная анестезия	0,5	0,5	20-30	100-150	15-30	2-3	-
	0,25	2,5	20-30	50-75	20-30	1-2	-

Лидокаин



	Концентрация	Без адреналина, мл	С адреналином, мл	Начало эффекта, мин	Продолжительность, ч
Поясничный отдел Анальгезия	1,0%	10-20	15-30	5-7	1,5 – 2,5
	1,5%	5-15	15-30		
	2,0%	5-10	10-25		
Каудальный блок Анальгезия	1,0%	10-20	15-30	5-7	1,5 – 2,5
	1,5%	5-15	15-30		

Эпидуральная аналгезия в родах - Мибы!

ЭА можно только при открытии шейки матки на 3-4 см

ЭА увеличивает частоту оперативного родоразрешения

ЭА приводит к неврологическим осложнениям

Местные анестетики токсичны для плода

ЭА вредна для плода

ЭА нарушает грудное вскармливание

ЭА вызывает сепсис новорожденных

Риск развития ацидоза ($\text{рН} < 7,2$) у плода при различных вмешательствах

Процедура	OR	95% интервал
Эпизиотомия	1.096	0.07–16.6
Инфузия окситоцина	16,48	1,21–226,1
Вакуум-экстракция	10,76	1,025–112,9
Эпидуральная аналгезия	0,074	0,003–2,09

FETAL ACIDOSIS FROM OBSTETRIC INTERVENTIONS DURING THE FIRST VAGINAL DELIVERY

Chi-Feng Su^{1,2}, Horng-Jyh Tsai¹, Che-Cheng Huang¹, Kan-Hung Luo¹, Long-Yau Lin^{2*}

¹Department of Obstetrics and Gynecology, Kuang Tien General Hospital, and ²Department of Obstetrics and Gynecology and Institute of Medicine, China Shan Medical University, Taichung, Taiwan

Taiwan J Obstet Gynecol · December 2008 · Vol 47 · No 4


Мониторинг состояния плода в родах

- Аусcultация сердцебиений плода
- Кардиотокография
 - Ложноположительные результаты
 - Увеличенная частота оперативного родоразрешения
 - Не приводит к снижению ППЦНС
- ЭКГ плода
- Пульсоксиметрия плода
- Анализ pH крови из кожи головки плода
- Анализ газов крови из артерии пуповины
- Анализ уровня лактата в крови плода

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Intrapartum fetal heart rate monitoring: nomenclature, interpretation, and general management principles. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2009 Jul. 11 p. (ACOG practice bulletin; no. 106). Intrapartum fetal surveillance. In: Fetal health surveillance: antepartum and intrapartum consensus

«Эпидуральная анестезия увеличивает продолжительность второго периода родов».

Моторный блок



Лидокаин



Бупивакаин



Ропивакаин

Использование меньшей концентрации местного анестетика (бупивакаин, ропивакаин 0,2%, 0,125%, ультратризкая концентрация - 0,065%) с обязательным добавлением наркотического аналгетика (фентанил 50-100 мкг)


Постоянная инфузия бупивакаина или ропивакаина 0,25% со скоростью 6-10 мл/ч

Использование ропивакаина

Применение спинально-эпидуральной анестезии в родах с интрапекальным введением фентамила 10-15 мкг

Реальные проблемы

Постпункционные головные боли при
случайной пункции твердой мозговой оболочки




Постельный режим не менее 24 ч?

Кофеин в/м, в/в ?

Аналгетики: кетонал (кетопрофен) в/м, в/в, свечи?

Инфузия до 2000 мл?

Пломбирование эпидурального пространства аутокровью - epidural blood-patch (EBP)




Артериальная гипотония при нейроаксиальной анестезии:

Механизм развития:

Блокада симпатических ганглиев – вазодилатация

Аорто-кавальная компрессия



Методы профилактики:

Поворот на левый бок на 15⁰ и более – профилактика аортокавальной компрессии (в родах – положение на боку)

Инфузионная поддержка (коллоиды 500 мл, кристаллоиды 1000 мл)

Вазопрессоры – мезатон, эфедрин при снижении АД менее 80 мм рт.ст.

Компрессия нижних конечностей

Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia

*An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on
Obstetric Anesthesia**

- Регионарная анестезия эффективнее всех других методов обезболивания родов и должна быть всегда доступна
- Необходимость обезболивания является достаточным показанием для применения эпидуральной аналгезии.
- Степень открытия шейки матки на момент выполнения регионарной анестезии не влияет на частоту кесарева сечения и других осложнений со стороны матери и плода.
- Отказ от регионарной анестезии не должен быть основан на степени раскрытия шейки матки
- Влагалищное родоразрешение после операции кесарева сечения не является противопоказанием для регионарной анестезии

ACOG Committee Opinion number 269 February 2002. Analgesia and cesarean delivery rates. American College of Obstetricians and Gynecologists, American Society of Anesthesiologists

Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia, 2007

Причины неудач при проведении эпидуральной аналгезии в родах

- Незнание анестезиологом особенностей обезболивания родов (высокие дозы МА, моторный блок, положение на спине, артериальная гипотония)**
- Попытка акушера-гинеколога форсировать второй период родов увеличением дозы окситоцина или механическим способом в условиях моторного блока**
- Отсутствие адекватного мониторинга состояния плода в родах**
- Несвоевременное родоразрешение**

Мастера вызывали?



Перинатальная заболеваемость и смертность

Обезболивание операции кесарева сечения



Преимущества регионарной анестезии при операции кесарева сечения:

- Профилактика аспирационного синдрома
- Нет трудной интубации трахеи
- Минимальная фармакологическая нагрузка на плод и новорожденного
- Гипотензивный эффект
- Интервал до извлечения плода во время операции кесарева сечения не ограничен во времени
- Профилактика тромбоэмбологических осложнений
- Снижение объема кровопотери
- У новорожденных нет различий по шкале Апгар на 5 мин при общей и регионарной анестезии

Разовая доза препаратов при проведении эпидуральной анестезии при операции кесарева сечения:


- Ропивакаин 0,75% – 15-20 мл**
- Бупивакаин 0,5% – 15-20 мл**

**Для усиления и пролонгирования эффекта – фентанил 50-100 мкг +
седация внутривенно тиопентал натрия 50-100 мг, пропофол 30-50 мг.**

Bachmann-Mennenga B, Veit G, Biscoping J, Epidural ropivacaine 1% with and without sufentanil addition for Caesarean section Acta Anaesthesiol Scand. 2005 Apr;49(4):525-31
Sanders RD, Mallory S, Lucas DN Extending low-dose epidural analgesia for emergency Caesarean section using ropivacaine 0.75%. Anaesthesia. 2004 Oct;59(10):988-92.


Преимущества спинальной анестезии перед эпидуральной при операции кесарева сечения

- Простота выполнения
- Более быстрое начало эффекта
- Более дешевый метод
- Менее болезненная при исполнении
- Более низкая доза местных анестетиков
- Более полный блок




Иглы для спинальной анестезии (по типу среза)



Срез Квинке



Карандашная заточка
Pencil-point




Иглы только № 25-29 G !!!



Сканирующая электронная
микрофотография отверстия
в твердой мозговой оболочке, сделанного (режущей) иглой Quincke 25 G

Куликов А.В.

Что неправильно ?



Схемы спинальной анестезии при операции кесарева сечения

Интратекально:

- **Маркаин спинал (хэви) -8,0-10,0-12,5-15,0 мг**
- **Лидокин 2% - 60-80 мг**
- **Ропивакаин 12-15 мг**

Седация – пропофол 30-50 мг, тиопентал натрия – 50-100 мг, изучается дексдор

Осложнения регионарной анестезии

- К группе немедленных осложнений относятся:
 - Артериальная гипотония
 - Брадикардия, асистолия
 - Тошнота и рвота
 - Гипотермия и озноб.
 - Высокий и тотальный спинальный блок.
 - Кожный зуд (при использовании опиатов).
 - Внутривенное введение местного анестетика (1:11000);
- В группу отсроченных осложнений включают:
 - Постпункционную головную боль
 - Постпункционные боли в спине
 - Задержка мочи
 - **Неврологические осложнения:**
 - А Транзиторный неврологический синдром
 - В Синдром конского хвоста
 - С Неврологический дефицит вследствие повреждения иглой спинного мозга, спинномозговых нервов и корешков сосудов эпидурального сплетения.
 - **Инфекционные осложнения: постпункционные менингиты и менингоэнцефалиты, эпи- и субдуральные абсцессы**

Противопоказания к нейроаксиальной анестезии в акушерстве

- нежелание пациента;
- недостаточная компетентность врача в технике обезболивания, его проведения и лечения возможных осложнений;
- выраженная гиповолемия (геморрагический шок, дегидратация)
- нарушение свертывания крови в сторону гипокоагуляции (МНО, АПТВ более 1,5 N) и тромбоцитопении - менее $75\text{-}100 \cdot 10^9$, приобретенные или врождённые коагулопатии . Вопрос решается индивидуально и при контроле ТЭГ

Противопоказания к нейроаксиальной анестезии в акушерстве


- гнойное поражение места пункции;
- непереносимость местных анестетиков;
- у больной с фиксированным сердечным выбросом (искусственный водитель ритма сердца, стеноз аортального клапана, коарктация аорты, выраженный стеноз митрального клапана) **Вопрос согласуется с кардиохирургом/кардиологом**
- тяжелая печеночная недостаточность
- демиелинизирующие заболевания нервной системы (в отдельных случаях при декомпенсации)



Н. И. Пирогов
(1810—1881).

С. К. Кликович.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ



Показания к общей анестезии в акушерстве

- **Малые акушерские операции (тиопентал натрия, кетамин, пропофол)**
- **Анестезия при IVF - вспомогательные репродуктивные технологии (пропофол)**
- **Анестезия при хирургических операциях во время беременности (нежелательно применять закись азота и бензодиазепины)**
- **Анестезия при эмбриональных операциях**
- **Консервативное и оперативное родоразрешение**

Practice Guidelines for Obstetrical Anesthesia: A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetrical Anesthesia
Anesthesiology: Volume 90(2) February 1999 pp 600-611

Ni Mhuireachtaigh R, O'Gorman DA. Anesthesia in pregnant patients for nonobstetric surgery.J Clin Anesth. 2006 Feb;18(1):60-6.
Shnider S.M. Anesthesia for obstetrics/S.M. Shnider, G. Levinson. -Williams&Wilkins-1993. -744 p.

Chadwick H.S. Obstetric anesthesia - Then and now // Minerva Anestesiol 2005;71:517-20
Cox PB, Gogarten W, Strumper D, Marcus MA. Fetal surgery, anaesthesiological considerations.
Curr Opin Anaesthetiol. 2004 Jun;17(3):235-40
Куликов А.В.

Показания к общей анестезии при операции кесарева сечения

Только при противопоказаниях для нейроаксиальной!!!

Традиции, привычки, желание анестезиолога или акушера в расчет не принимаются!

Practice Guidelines for Obstetrical Anesthesia: A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetrical Anesthesia

Anesthesiology: Volume 90(2) February 1999 pp 600-611

Littleford J. Effects on the fetus and newborn of maternal analgesia and anesthesia: a review.

Can J Anaesth. 2004 Jun-Jul;51(6):586-609

Shnider S.M. Anesthesia for obstetrics/S.M. Shnider, G. Levinson. -Williams&Wilkins-1993. –744 р.

Аnestezia и реанимация в акушерстве и гинекологии /В.И. Кулаков, В.Н. Серов, А.М. Абубакирова, Е.А. Чернуха.- М:.-Издательство «Триада-Х», 2000.-384 с.



...Даже вопрос так не стоит: использовать нейроаксиальную анестезию в акушерстве или нет...

Препараты для общей анестезии в акушерстве

- Барбитураты (тиопентал натрия)
- Кетамин
- Ингаляционные анестетики (закись азота, фторотан, энфлюран изофлюран, десфлюран, **севофлюран**)
- Миорелаксанты (сукцинилхолин, рокурониум -эсмерон, цисатракуриум - нимбекс)
- Наркотические аналгетики (морфин, **фентанил**, альфентанил, **ремифентанил**)
- Бензодиазепины (диазepam, мидазолам)
- Пропофол (по инструкции противопоказан во время беременности)

БРАЙДАН® показан для восстановления нейромышечной проводимости после блока, вызванного рокуронием или векуронием


ДЕКСМЕДЕТОМИДИН для продолжительной (1-14 сут) легкой-умеренной («0» - «-3» стадии по Ричмондской шкале RASS) седации больных на ИВЛ

У всех учреждений должны быть протоколы для следующих мероприятий по обеспечению безопасности пациента:

- Проверка оборудования и лекарств.
- Дооперационная оценка и подготовка пациента
- Маркировка шприцев
- Трудная/неудавшаяся интубация трахеи
- Злокачественная гипертермия
- Анафилаксия
- Токсичность местных анестетиков
- Массивное кровотечение
- Инфекционный контроль
- Послеоперационная терапия, включая лечение боли



Рожайте улыбаясь!



kulikov1905@yandex.ru

8 912 2471023