

Роненсон А.М.

Заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
ГБУЗ Тверской области
«ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной»



Эмболия околоплодными

водами (AFE)


Current evidence

& Case report




Конфликт интересов

«У МЕНЯ НЕТ СПОНСОРОВ...»



Эмболия околоплодными водами (AFE)


- Заболеваемость и смертность
- Этиология и факторы риска
- Клиническая картина и лечение
- Case report



Немного истории...

Мэтью Бэйли (27 октября 1761 - 23 сентября 1823 года) был шотландским врачом и патологоанатомом

В 1789 был свидетелем *внезапной смерти многорожавшей женщины после «буйных» родов*



Meyer J. Embolia pulmonary amniocaseosa. Bras Med 1926 ;2:301–303

Частота АФЕ

- Великобритания: 1,7 на 100 000

Fitzpatrick K, Tuffnell D, Kurinczuk J, Knight M. Incidence, risk factors, management and outcomes of amniotic-fluid embolism: a population-based cohort and nested case-control study. *BJOG* **2016**; 123:100–109

- США: 5,5 на 100 000

Knight M, Berg C, Brocklehurst P, et al. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. *BMC Pregnancy Childbirth* 2012; 12:7

- Канада: 3,2 на 100 000

Kramer MS, Abenhaim H, Dahhou M, et al. Incidence, risk factors, and consequences of amniotic fluid embolism. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2013; 27:436–441

- Новая Зеландия и Австралия: 5,4 на 100 000

McDonnell et al. Amniotic fluid embolism: an Australian-New Zealand population-based study *BMC Pregnancy and Childbirth* (2015) 15:352

- Япония: 5,0 на 100 000

Kanayama N, Tamura N. Amniotic fluid embolism: pathophysiology and new strategies for management. *J Obstet Gynaecol Res* 2014; 40:1507–1517

- Европа: 5,4 на 100 000

Conde-Agudelo A, Romero R. Amniotic fluid embolism: an evidence-based review. *Am J Obstet Gynecol* 2009; 201:445e1–445e13

Частота АФЕ

TABLE 4
Differential diagnosis of amniotic fluid embolism


	Amniotic fluid embolism	Hemorrhage	Sepsis	Anesthetic accident	Pulmonary thromboembolism	Systemic anaphylaxis
Hypotension	+++	+++	+++	+++	++	+++
Hypoxia	+++	+/-	+	+++	+++	+++
Coagulopathy	+++	+	+	No	No	No
Sudden onset	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes
Prior fever	No	No	Yes	No	No	No
Recognized antecedent event	No	Hemorrhage	Chorioamnionitis	Anesthetic administration	No	Medication administration

Clark. Case definition of amniotic fluid embolism to improve quality of clinical and translational research. Am J Obstet Gynecol 2016.

Наиболее распространенными заболеваниями кодируемыми по ошибке:

- гиповолемический шок
 - анестезиологические осложнения
 - тромбоэмболия лёгочной артерии
 - септический шок
 - анафилактический шок





— UK Obstetric Surveillance System —

Amniotic Fluid Embolism Study 01/15


Data Collection Form - CASE

Case Definition:

- EITHER** a clinical diagnosis of AFE (acute hypotension or cardiac arrest, acute hypoxia or coagulopathy in the absence of any other potential explanation for the symptoms and signs observed)
- OR** a pathological diagnosis (presence of fetal squames or hair in the lungs).

...возникшие без явно на то причин острая гипотония или остановка сердца, острая гипоксия или коагулопатия...

International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS)



‘an acute cardio-respiratory collapse within 6 hours after labour, birth or ruptured membranes, with no other identifiable cause, followed by acute coagulopathy in those women who survive the initial event’

‘острый кардио-респираторный коллапс в течение 6 часов после родов, во время родов или разрыва плодных оболочек, без какой-либо другой явной причины, за которым следует острая коагулопатия у тех женщины, которые выжили после начальных событий’

Частота АФЕ

В среднем 1 на 40 000

Clark SL. Amniotic fluid embolism. Obstet Gynecol 2014; 123:337–348



Comparison of the Different Definition Criteria for the Diagnosis of Amniotic Fluid Embolism

HIROSHI KOBAYASHI¹, JURIA AKASAKA², KATSUHIKO NARUSE³, TOSHIYUKI SADO⁴, TAIHEI TSUNEMI⁵, EMIKO NIIRO⁶, KANA IWAI⁷



Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017 Jul; Vol-11(7): QC18-QC21

Сравнение различных определений АФЕ

Только **38,9%** рожениц подходили трем наборам критериев определения АФЕ (США, Великобритания и Япония)

Апрель 2005 – Декабрь 2012 года

26 случаев с АФЕ, 18 из которых подтвердились

Смертность АФЕ

- Великобритания: 0,3 на 100 000

Fitzpatrick K, Tuffnell D, Kurinczuk J, Knight M. Incidence, risk factors, management and outcomes of amniotic-fluid embolism: a population-based cohort and nested case-control study. *BJOG* **2016**; 123:100–109

- США: 1,3 на 100 000

Knight M, Berg C, Brocklehurst P, et al. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. *BMC Pregnancy Childbirth* 2012; 12:7

- Канада: 0,8 на 100 000

Kramer MS, Abenhaim H, Dahhou M, et al. Incidence, risk factors, and consequences of amniotic fluid embolism. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2013; 27:436–441

- Новая Зеландия и Австралия: 0,8 на 100 000

McDonnell et al. Amniotic fluid embolism: an Australian-New Zealand population-based study *BMC Pregnancy and Childbirth* (2015) 15:352

- Китай: 4,4 на 100 000

Mu et al. Amniotic fluid embolism as a cause of maternal mortality in China between 1996 and 2013: a population-based retrospective study. *BMC Pregnancy and Childbirth* (**2016**) 16:316

- Франция 0,95 на 100 000

Bonnet, Marie-Pierre MD, PhD et all. Maternal Death Due to AFE:A National Study in France. *Anesthesia & Analgesia*: September 28, 2017

Смертность АФЕ

В среднем 0,5 – 1,7 на 100 000

Conde-Agudelo A, Romero R. Amniotic fluid embolism: an evidence-based review.
Am J Obstet Gynecol 2009; 201:445e1–445e13



Figure 2.4: Maternal mortality by cause 2012–14



Maternal, Newborn and
Infant Clinical Outcome
Review Programme



Saving Lives, Improving Mothers' Care

Surveillance of maternal deaths in the UK 2012–14 and lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2009–14



THE JOURNAL OF
Obstetrics and Gynaecology Research

[Explore this journal >](#)

Original Article

Amniotic fluid embolism mortality rate

Michael D. Benson 

First published: 17 August 2017 [Full publication history](#)

Анализ данных до 12 Ноября 2016 г.

Летальность 20,4%

Maternal Death Due to Amniotic Fluid Embolism: A National Study in France.

Bonnet, Marie-Pierre MD, PhD; Zlotnik, Diane MD; Saucedo, Monica MD, PhD; Chassard, Dominique MD, PhD; Bouvier-Colle, Marie-Hélène PhD; Deneux-Tharaux, Catherine MD, PhD; for the French National Experts Committee on Maternal Mortality

Anesthesia & Analgesia: Post Author Corrections: September 28, 2017

Материнская смерть от АФЕ:
национальное исследование во Франции 2007 – 2011 г.

39 случаев – 36 летальные...

Выживаемость АФЕ

В 1980-х годах около 20%, в настоящее время около 80%^{1,2,3}

В случае успешного исхода до 60% выживших остаются с неврологическими дефицитом⁴



1. Abenhaim HA, Azoulay L, Kramer MS, Leduc L: Incidence and risk factors of amniotic fluid embolisms: A population-based study on 3 million births in the United States. *Am J Obstet Gynecol* 2008; 199:49 – 8
2. Knight M, Tuffnell D, Brocklehurst P, Spark P, Kurinczuk JJ, UK Obstetric Surveillance System: Incidence and risk factors for amniotic-fluid embolism. *Obstet Gynecol* 2010; 115: 910 – 7
3. Gei AF, Vadhera RB, Hankins GD: Embolism during pregnancy: Thrombus, air, and amniotic fluid. *Anesthesiol Clin North America* 2003; 21:165– 82
4. Tuffnell DJ. United kingdom amniotic fluid embolism register. *BJOG* 2005; 112:1625–1629.

Факторы риска АФЕ

DOI: 10.1111/1471-0528.13300
www.bjog.org

General obstetrics

Incidence, risk factors, management and outcomes of amniotic-fluid embolism: a population-based cohort and nested case-control study

KE Fitzpatrick,^a D Tuffnell,^b JJ Kurinczuk,^a M Knight^a

^a National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford, Oxford, UK ^b Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Bradford, UK

Correspondence: KE Fitzpatrick, National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford, Old Road Campus, Oxford OX3 7LF, UK.
Email Kate.fitzpatrick@npeu.ox.ac.uk

Accepted 7 December 2014. Published Online 12 February 2015.

120 случаев АФЕ

Февраля 2005 - Январь 2014

UK Obstetric Surveillance System (UKOSS)

53% произошли во время родов, в среднем сроке 39 недель (28-42 нед.)

47% после родов, в среднем через 19 минут (1 мин. – 6 ч. 27 мин.)

Факторы риска АФЕ

Table 1. Comparison of characteristics of cases and controls

Risk factor	No. (%) of cases (n = 120)	No. (%) of controls (n = 3834)	Unadjusted OR (95% CI)	P-value	Adjusted OR (95% CI)*	P-value
Sociodemographic factors						
Age (in years)						
<35	74 (62)	3062 (80)	1	Возраст > 35, риск 2,5 раза	1	
35 or older	46 (38)	766 (20)	2.48 (1.71–3.62)	<0.0001	2.15 (1.43–3.23)	0.0002
Missing	0 (0)	6 (0)				
Current pregnancy						
Multiple pregnancy				Многоплодная беременность, риск 10,5 раз		
No	106 (88)	3786 (99)	1		1	
Yes	14 (12)	48 (1)	10.42 (5.57–19.48)	<0.0001	7.75 (3.60–16.69)	<0.0001
Induction of labour using any method				Любая индукция родов, риск 2,2 раза		
No	71 (59)	2921 (76)	1		1	
Yes	49 (41)	908 (24)	2.22 (1.53–3.22)	<0.0001	2.53 (1.70–3.75)	<0.0001
Missing	0 (0)	5 (0)				
Placenta praevia						
No	116 (97)	3797 (99)	1		1	
Yes	3 (3)	22 (1)	4.46 (1.32–15.12)	0.0163	5.75 (1.64–20.19)	0.0064
Missing	1 (1)	15 (0)				

Прогнозирование, профилактика, биомаркеры

THE JOURNAL OF
Obstetrics and Gynaecology Research

doi:10.1111/jog.13453



J. Obstet. Gynaecol. Res. 2017

Squamous cell carcinoma antigen as a novel candidate marker for amniotic fluid embolism

Natsuki Koike¹ , Hidekazu Oi², Katsuhiko Naruse¹, Naohiro Kanayama³ and Hiroshi Kobayashi¹

¹Department of Obstetrics and Gynecology, Nara Medical University, Nara, ²Department of Obstetrics and Gynecology, Kindai University Nara Hospital, Ikoma, ³Department of Obstetrics and Gynecology, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan

Squamous cell carcinoma – антиген ???

Чувствительность 60,0%

Специфичность 89,2%



Amniotic fluid embolism: despite progress, challenges remain

CONCLUSION

Although the incidence of AFE continues to be low and the mortality has been decreasing over the past few decades, this potentially devastating syndrome remains a feared entity in both the obstetric and critical care realms. Prompt identification and aggressive supportive measures are the mainstay of treatment and involve the interdisciplinary efforts from multiple clinical specialty teams. There is an acute need for better ways to diagnose AFE early, with a number of promising biomarkers currently in various stages of development and investigation.

Kathryn J. Balinger^a, Melissa T. Chu Lam^b, Heidi H. Hon^a,
Stanislaw P. Stawicki^a, and James N. Anasti^b

Из-за молниеносного прогрессирования симптомов AFE, все биомаркеры имеют ограниченную клиническую ценность, и ни один из них не обеспечивает «раннего предупреждения»

Патогенез АФЕ

Известно 100% - патогенез до конца не ясен...

Предыдущая теория

Амниотическая жидкость проникает в кровоток матери за счет разницы градиента давления

Клеточный материал вызывает обструкцию легочной артерии

ГИПОКСИЯ

Настоящая теория

Пассивное проникновение амниотической жидкости в кровоток матери


Патологическая реакция на фетальный материал

Иммунно-восполительная реакция
«Иммунологический штурм»
«Анафилактоидный синдром
беременных»³

Попадание фетального материала в кровоток матери порой происходит без каких либо проявлений ¹, и он **обнаруживается почти у 1/3 рожениц** ²

1. Tamura N, Farhana M, Oda T, Itoh H, Kanayama N. Amniotic fluid embolism: Pathophysiology from the perspective of pathology. J Obstet Gynaecol Res. 2017 Feb 11
2. Benson MD. A hypothesis regarding complement activation and amniotic fluid embolism. Med Hypotheses 2007; 68:1019–1025
3. Conde-Agudelo A, Romero R. Amniotic fluid embolism: an evidence-based review. Am J Obstet Gynecol 2009; 201: 445 e1–445 13.




Клиническая картина АФЕ



Right heart masses demonstrated by echocardiography in a patient with amniotic fluid embolism during labour

K. H. Maack¹ , K. Munk², K. Dahl³, H. H. Jørgensen⁴, A. Christiansen⁵ and R. B. Helmig³

➤ Длительность первой
расходы и сокращения



трикуспидальная регу


Conde-Agudelo A, Romero R. Amniotic fluid based review. Am J Obstet Gynecol (2009) 20

Клиническая картина (двуухфазный ответ на АФЕ)

Вторая фаза (геморрагическая)

- Левожелудочковая недостаточность
- Бивентрикулярная недостаточность
- Отек легких (ОРДС)
- **Атония матки, коагулопатия и ДВС**





Только **38,9%** рожениц подходили трем наборам критериев определения АФЕ (США, Великобритания и Япония)

Большинство японских акушеров включают «рожениц с кровотечением в качестве **первых проявлений АФЕ**, у которых не было кардио-респираторного коллапса»^{1,2,3}

1. Hasegawa J, Sekizawa A, Tanaka H, Katsuragi S, Osato K, Murakoshi T, et al. Maternal death exploratory committee in japan; japan association of obstetricians and gynecologists. current status of pregnancy-related maternal mortality in Japan: a report from the maternal death exploratory committee in Japan. BMJ Open. 2016 ;6(3):e010304.
2. Kanayama N, Inori J, Ishibashi-Ueda H, Takeuchi M, Nakayama M, Kimura S, [5] et al. Maternal death analysis from the Japanese autopsy registry for recent 16 years: significance of amniotic fluid embolism. J Obstet Gynaecol Res. 2011;37(1):58-63.
3. Hasegawa A, Murakoshi T, Otsuki Y, Torii Y. Clinical course of disseminated intravascular coagulopathy-type amniotic fluid embolism: A report of three cases. J Obstet Gynaecol Res. 2016 ;42(12):1881-85.

?? «AFE матки» ??

Локальный поток амниотической жидкости в ткани матки может вызвать «анафилактоидную реакцию в матке», в результате чего происходит ДВС или атоническое кровотечение¹

Члены сообществ *Maternal Mortality Evaluation Committee* и *Association of Obstetricians and Gynaecologists* в Японии

«...тяжелые случаи ДВС или атонического кровотечения, которые не поддаются различным методам лечения, считать

«легким/слабым AFE»

1. Kanayama N, Tamura N. Amniotic fluid embolism: pathophysiology and new strategies for management. J Obstet Gynaecol Res. 2014;40(6):1507-17.

Наличие в сосудах матки **компонентов амниотической жидкости и эмбриональных материалов**, не является специфическим показателем для АФЕ и присутствует **почти у одной трети** рожениц, и **не всегда приводит к ДВС или АФЕ**^{1, 2}

??? «**АФЕ матки**» ???



1. Benson MD, Cheema N, Kaufman MW, Goldschmidt RA, Beaumont JL. Uterine intravascular foetal material and coagulopathy at peripartum hysterectomy. *Gynecol Obstet Invest.* 2012;73(2):158-61.
2. Nakagami H, Kajihara T, Kamei Y, Ishihara O, Kayano H, Sasaki A et al. Amniotic components in the uterine vasculature and their role in amniotic fluid embolism. *J Obstet Gynaecol Res.* 2015 ;41(6):870-75.

Основные направления в терапии АФЕ

Review Article

iMedPub Journals

<http://www.imedpub.com/>

DOI: 10.21767/2471-9641.100018

Journal of Medical Toxicology and Clinical Forensic Medicine

ISSN 2471-9641

2016

Vol.2 No.2:6

Amniotic Fluid Embolism: An Update of the Evidence

Isabella Piva, Scutiero G and Greco P

Department of Morphology, Surgery and Experimental Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy

- Адекватная оксигенация
 - Гемодинамическая стабильность
 - Лабораторные тесты
 - Центральный венозный доступ
 - Экстренное кесарево сечение
 - Послеродовый период

Гемодинамическая стабильность

Price et al. Critical Care 2010, 14:R169
<http://ccforum.com/content/14/5/R169>



RESEARCH

Open Access

Pulmonary vascular and right ventricular dysfunction in adult critical care: current and emerging options for management: a systematic literature review

Laura C Price^{1†}, Stephen J Wort^{1†}, Simon J Finney¹, Philip S Marino¹, Stephen J Brett²



Легочная гипертензия (повышенное сопротивление легочных сосудов)

Правожелудочковая недостаточность

+/- Левожелудочковая недостаточность

Гемодинамическая стабильность

Сопротивление
легочных сосудов


Сопротивление легочных сосудов /
системное сосудистое сопротивление

Table 5 Pulmonary vascular properties of vasoactive agents

	Cl	PVR	SVR	PVR/SVR	Tachycardia	Renal ^a /metabolic			
Vasopressors				Dose related					
NE	+	+	++	+/-	+	Lactic acidosis			
PHE ОСТОРОЖНО	-	++	+	+	-	-			
Low-dose AVP	+/-	+/-	++	-	-	Diuresis ++			
Inotropes									
Dobutamine	++	-	-	-	+				
<5 µg/kg/min									
Dopamine	+	+/-	+	+	++	Natriuresis			
Epinephrine	++	-	++	-	++	Lactic acidosis			
Inodilators									
PDE IIIIs СИЛЬНЫЕ	++	-	-	-	+/-	-			
Levosimendan	++	-	-	-	-	-			

AVP, arginine vasopressin; NE, norepinephrine; PDE IIIIs, phosphodiesterase inhibitors; PHE, phenylephrine. ^aRenal blood flow is likely to improve with increased cardiac output and systemic blood pressure with all agents.

Гемодинамическая стабильность



Раннее начало инотропной и вазопрессорной поддержки

Добутамин

Милринон

Норадреналин


Основные направления в терапии АФЕ

Лабораторные тесты



Основные направления в терапии АФЕ

- При неконтролируемом РРН, **начало трансфузии** раньше хирургического вмешательства, преимущественно СЗП



Новое в терапии АФЕ

- Концентрат Анти тромбина III ¹
- ЭКМО ^{2, 3, 9}
- Тромбэмболэктомия ⁴
- Концентрат С1-ингибитора ^{6, 7}
- Гемодиафильтрация и плазмообмен ⁵
- Оксид азота ⁸



1. Kobayashi H. Amniotic fluid embolism: anaphylactic reactions with idiosyncratic adverse response. *Obstet Gynecol Surv* **2015**; 70:511–517.
2. SharmaNS, Wille KM, BellotSC, Diaz-Guzman E. Modern use of extracorporeal life support in pregnancy and postpartum. *ASAIO J* **2015**; 61:110–114.
3. Moo Suk Park, M.D. Urgent Application of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Amniotic Fluid Embolism. *Korean Journal of Critical Care Medicine* **2016**; 31(3): 179-180.
4. Wiznitzer et al. Amniotic Fluid Embolism: Combined Treatment with Surgery and Extracorporeal Membrane Oxygenation Support - A Case Report. *Obstet Gynecol cases Rev* **2016**, 3:082
5. Ogihara T, Morimoto K, Kaneko Y. Continuous hemodiafiltration for potential amniotic fluid embolism: dramatic responses observed during a 10-year period report of three cases. *Ther Apher Dial* 2012; 16:195–197.
6. Tamura N, Farhana M, Oda T, Itoh H, Kanayama N. Amniotic fluid embolism: Pathophysiology from the perspective of pathology. *J Obstet Gynaecol Res*. **2017 Feb 11**
7. Todo Y, Tamura N, Itoh H, Ikeda T, Kanayama N. Therapeutic application of C1 esterase inhibitor concentrate for clinical amniotic fluid embolism: a case report. *Clin Case Rep* **2015**; 3: 673–675.
8. Derek J. Tuffnell, Elizabeth Slemeck. Amniotic fluid embolism. *Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine* (**2017**), V. 27, Issue 3, Pages 86–90
9. Tobin, C.D.. Amniotic Fluid Embolism during Dilation and Evacuation during 2ndTrimester Treated by ACLS Guidelines, ECMO and Dialysis: A Case Report (**2017**) *J Anesth Surg* 4(2):1- 3.

Интенсивная терапия эмболии околоплодными водами при беременности и родах

Клинические рекомендации.

Протоколы лечения

Утверждены на Пленуме Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов от 14.10.2015 г., Москва.

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией по анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения Российской Федерации на заседании от 24.03.2016.

Составители:

Баялиева А.Ж. (Казань), Фаткуллин И.Ф. (Казань), Шифман Е.М. (Москва), Милованов А.П. (Москва), Куликов А.В. (Екатеринбург), Хасанов А.А. (Казань).

Рецензент:

Дробинская А.Н. (Новосибирск).

Интенсивная терапия острых нарушений гемостаза в акушерстве (коагулопатия, ДВС-синдром)

Клинические рекомендации.

Протоколы лечения

Куликов А.В., Шифман Е.М., Булатов А.Ю.,
Заболотских И.Б., Синьков С.В.

Утверждены решением Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» 17 мая 2015 года.

При участии Ассоциации акушерских анестезиологов – реаниматологов:
проф. Шифман Е.М., проф. Куликов А.В.



Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejogrb



Full length article

Reproductive decisions after the diagnosis of amniotic fluid embolism



Amirhossein Moaddab^a, Miranda Klassen^b, Cynthia D. Priester^a, Elvira H. Munoz^a, Michael A. Belfort^a, Steven L. Clark^a, Gary A. Dildy^{a,*}

^a Department of Obstetrics and Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, United States

^b Amniotic Fluid Embolism Foundation, Vista, CA, United States

Репродуктивные решения после перенесенной эмболии околоплодными водами

Было проанализировано 116 историй болезни с АФЕ, 80 женщин остались способны к дальнейшей беременности

Репродуктивные решения после диагностики эмболии околоплодными водами

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 211 (2017) 33–36



Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Obstetrics & Gynecology and
Reproductive Biology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejogrb



Full length article

Reproductive decisions after the diagnosis of amniotic fluid embolism



Amirhossein Moaddab^a, Miranda Klassen^b, Cynthia D. Priester^a, Elvira H. Munoz^a,
Michael A. Belfort^a, Steven L. Clark^a, Gary A. Dildy^{a,*}

^a Department of Obstetrics and Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, United States

^b Amniotic Fluid Embolism Foundation, Vista, CA, United States

Последующая беременность:

2 беременность – 17 женщин

3 беременность – 5 женщин

4 беременность – 1 женщина

5 беременность – 1 женщина

34 женщины решились на последующие беременности

Выкидыш – 7 и Аборт - 1

Естественные роды – 8

Кесарево сечение – 16

Текущая беременность – 2

Клинический случай

**Случай успешной реанимации роженицы
с эмболией околоплодными водами**

Клинический случай

Пациентка К, 39 лет, беременность 3, роды 2, поступила в стационар Перинатального центра 8.12.16, на плановое кесарево сечение.

D.S.: Беременность 39 недель, избыточный вес плода требующий предоставление медицинской помощи, гестационный диабет, сахарный многоводие, амниотомия.

Пациентка доставлена в операционную, подготовлена к выполнению спинальной анестезии, в 9.42 выполнена СА, без особенностей.



Клинический случай

В 10.00.05: была извлечена живая доношенная девочка, 8 баллов по шкале Апгара.

В 10.00.42: у пациентки возникают тонико-клонические судороги, с потерей сознания до 3 баллов по ШКГ, с угнетением дыхание, и появление акроцианоза в области лица, верхней половины грудной клетки.

Начата вентиляция 100% кислородом, подготовка к интубации трахеи.

АД = 160/100 мм рт.ст., PS = 120 уд/мин, был вызван заведующий ОАР.



Клинический случай

После интубации (RSI) через 2 минуты тенденция к гипотонии, введен Мезатон, далее инфузия Норадреналина.

В 10.09: на фоне продолжающейся гипотонии происходит остановка сердечной деятельности по типу асистолии.

Расширенные реанимационные мероприятия.

Восстановление спонтанной циркуляции через 6 минут, с нестабильной гемодинамикой, отмечается рост зубца Р во II и AVF отведениях, депрессия ST.



Клинический случай

Акушер-гинекологи обращают внимание на гематомы по всей поверхности матки, кровотечение из швов на матке.

Выставляется диагноз ДВС синдром, на фоне продолжающегося кровотечения разворачивается Cell – Saver.


Экстирпация матки без придатков.

Проводиться инфузионная терапия, кардиотоническая, плазма- и гемотрансфузия, аутогемотрансфузия.

Проведен анализ ТЭГ, лабораторный анализ.




66,5 минут до МА (max плотность сгустка)



Клинический случай

По окончанию операции
сделана Rg грудной клетки:
расширение правых границ
сердца, с его ротацией.



Клинический случай

Пациентка оставлена под наблюдение в операционной на 2 час.

Перед переводом гемодинамика стабильна, без инотропной поддержки, переведена в палату ОАР

Интраоперационно:

Гемотрансфузия = 500 мл

Аутогемотрансфузия = 200 мл

СЗП = 1400 мл

Кристаллоиды = 3000 мл

Кровопотеря = 3000 мл

Инфузия = 4700 мл



Пол: Женский Возраст: 39 лет.

Фаза цикла: не указана

Куда: **ОАиР**

Биоматериал: кровь венозная

Параметры	Результат	Ед. измерения	Норма
Эритроциты (RBC)	3,97	10 ¹² /л	4 - 5,2
Гемоглобин (HGB)	115,00	г/л	120 - 160
Гематокрит (HCT)	34,00	%	36 - 46
Цветной показатель	0,87		0,85 - 1,05
Средний объём эритроцита (MCV)	86,00	фл	80 - 100
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	29,00	пг	26 - 34
Средняя концентрация Hb в эритр. (MCHC)	33,70	г/дл	31 - 37
Степень анизоцитоза эритроцитов (RDW)	14,40	%	11,5 - 14,5
Тромбоциты (PLT)	154,00	10 ⁹ /л	150 - 400
Степень анизоцитоза тромбоцитов (PDW)	9,90	%	10 - 20
Средний объем тромбоцитов (MPV)	7,50	фл	7,4 - 10,4
Тромбокрит (PCT)	0,12		
Лейкоциты	18,10		

Пол: Женский Возраст: 39 лет.

Фаза цикла: не указана

Куда: **Операционное
отделение**

Биоматериал: кровь венозная

Параметры	Результат	Ед. измерения	Норма
Протромбиновый индекс	67,9	%	80 - 105
% протромбина по Квику	59,2	%	70 - 130
Международное нормализованное отношение (МНО)	1,48		0,8 - 1,2
Фибриноген	2,0	г/л	1,69 - 3,92
АЧТВ	41,0	секунда	24,3 - 35

Билирубин общий	31,0	мкмоль/л	5 - 21
Билирубин прямой	11,5	мкмоль/л	0 - 5
Билирубин непрямой	19,5	мкмоль/л	1,5 - 17,5
Аланингидратаза	15,9	Е/л	5 - 40
Аспартаттрансфераза	33,9	Е/л	5 - 40
Мочевина	4,4	ммоль/л	2,1 - 7,1
Креатинин крови	88,0	мкмоль/л	53 - 97
Калий	3,7	ммоль/л	3,4 - 5,1
Натрий	137,0	ммоль/л	137 - 150
Магний	1,0	ммоль/л	0,7 - 0,99
Лактат	5,7	ммоль/л	0,5 - 2,2

Клинический случай

Продолжено лечение в палате ОАР

В динамике ЭХО-КГ через 10 часов: СДЛА = 48 мм рт.ст.; уменьшается.

К инфузии добавлено: СЗП = 300 мл, Эр. Масса = 200 мл, кристаллоиды = 1000 мл.

Качественный и количественный состав общей инфузии:

Гемотрансфузия = 700 мл

Аутогемотрансфузия = 200 мл

СЗП = 1700 мл

Кристаллоиды = 4000 мл

Кровопотеря = 3000 мл

Инфузия = 6500 мл

Конец первых суток: диурез = 30 мл/час, НЬ = 95 г/л, РЛТ = $129 \cdot 10^9$ /л, креатинин = 115,2 мкмоль/л, лактат = 3,1 ммоль/л, по газам крови компенсирована

Клинический случай


*На третьи сутки пациентка переведена
в многопрофильный стационар ГБУЗ ОКБ г. Тверь*

- **На 6 сутки** ЭХО-КГ: системическое давление в легочной артерии, рассчитанное по скорости струи трикуспидальной регургитации - 25-30 мм рт.ст. (<30 мм рт.ст.). размеры полостей сердца и их функциональное состояние в пределах нормы. Клапанная функция без гемодинамически значимой патологии.
- **На 10 сутки** была переведена на спонтанное дыхание.
- **На 20 сутки** выписана домой без какого либо неврологического дефицита.

Клинический случай

Положительный исход г

- Своевременность и по
- Четкое соблюдение
- эмболии околоплодн
- Техническая оснащён
- Слаженность коллекти



сит от:

рекомендаций по лечению



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Роненсон А.М.

email: a.ronenson@mail.ru





Акушерская анестезиология (Obstetric anesthesia)

■ Закрытая группа

Обсуждение

Участники

Мероприятия

Видео

Фото

Файлы

Статистика группы

Управление группой

Поиск в этой группе

Быстрые ссылки

Русский анестезиолог...



Присоединился(-ась) ▾

Уведомления

Поделиться

...



Публикация



Фото/видео



Прямой эфир



Еще



Напишите что-нибудь...

Фото/видео

Опрос

Чувства/дей...

...

ДОБАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

+ Введите имя или эл. адрес...



УЧАСТНИКИ

1 087 участников (35 новых)



ОПИСАНИЕ

Группа посвящена акушерской

Редактировать

ПРИКРЕПЛЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ