



Государственное бюджетное учреждение
**ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА им. В.П. ДЕМИХОВА**
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Взгляд хирурга на родоразрешение. Место хирургии в акушерстве и гинекологии

Докладчик: Васильченко М.И.

г. Рязань

2018 год

Эволюция Беременной




Заболевания почек

Наиболее часто встречается



- * пиелонефрит (20%),
- * гломерулонефрит (0.1 - 0.2%),
- * мочекаменная болезнь (0.1 - 0.2%).

* Во время беременности пиелонефрит бывает у 48% женщин, в послеродовом периоде 35%, в родах 17%.


Анатомия почек



Основные причины гидронефроза



Стадии гидронефроза






Основные симптомы

- ✓ Боль
- ✓ Изменения в моче
- ✓ Температура

УЗИ почек



УЗИ мочевого пузыря с ЦДК устьев мочеточников



Сравнение результатов лечения 2013-2014 VS 2015-2016

Тактика лечения пиелонефрита	Кол-во пациенток		Родоразрешение				Исход					
			Естественное		Кесарево сечение		Рождённые живыми		Выкидыш		Внут.утроб смерть	
	2013/2014	2015/2016	2013/2014	2015/2016	2013/2014	2015/2016	2013/2014	2015/2016	2013/2014	2015/2016	2013/2014	2015/2016
Обструктивный пиелонефрит (стентирование)	39	60	10	19	29	41	36	57	3	1	1	0
Обструктивный пиелонефрит (ЧПНС)	12	27	9	21	3	6	11	27	1	0	1★	0
Хронический пиелонефрит не обструктивный (консервативное лечение)	410	340	389	322	21	18	337	328	1	0	2	1

★ У беременной развился апостематозный пиелонефрит, антенатальная гибель плода, Кесарево сечение, нефрэктомия справа.

Консервативное лечение





Хирургическое лечение



Дренирование почек антирефлюксным мочеточниковым стентом



Чрескожная пункционная нефростомия



Острая хирургическая патология выявленная у беременных

Хирургическая патология	Группа 1 (n=68)		Группа 2 (n=57)	
	Абс.	%	Абс.	%
Острый аппендицит	31	45,6	22	38,5
Острый холецистит	14	20,6	12	21,1
Острая кишечная непроходимость	13	19,1	14	24,6
Острый панкреатит	10	14,7	9	15,8



Частота осложнений III триместра беременности после хирургического вмешательства у пациенток группы 1

Осложнения	Группа 1 (n=68)	
	Абс.	%
Нарушение МПК	41	60,3
Фетоплацентарная недостаточность	32	47,1
Преэклампсия	30	44,1
Угроза преждевременных родов	19	27,9
Маловодие	8	11,8
Многоводие	6	8,8
Аntenатальная гибель плода	3	4,4




Частота своевременных и преждевременных родов у пациенток группы 1

Варианты родов	Группа 1 (n=65)	
	Абс.	%
Своевременные роды	46	70,8
Преждевременные роды	19	29,2
Роды через естественные родовые пути	49	75,4
Кесарево сечение	16	24,6



Клиническая характеристика новорожденных




Доля новорожденных без признаков гипотрофии




Консервативная миомэктомия у беременной 21 неделя беременности. Нарушение питания миоматозного узла размером 10 см.




Консервативная миомэктомия у беременной 21 неделя беременности. Нарушение питания миоматозного узла размером 10 см.




Консервативная миомэктомия у беременной 21 неделя беременности. Нарушение питания миоматозного узла размером 10 см.



Наложение лапароскопического шва (серкляж) на шейку
у беременной 18 недель беременности.




Симультанные операции у беременных с острой хирургической патологией




Лапароскопическая резекция дермоидной кисты у беременной 18 недель беременности




Место хирургии в акушерстве и гинекологии.



Место хирургии в акушерстве и гинекологии.



Анатомия малого таза



Фармакологическое действие

Гемостатический препарат для местного применения.



ТАХОКОМБ состоит из коллагеновой губки, покрытой с одной стороны компонентами фибринового клея (высоконцентрированного фибриногена и тромбина), способствующего свертыванию крови.

При контакте с кровоточащей поверхностью или жидкостями организма содержащиеся в покрытии факторы свертывания высвобождаются. Тромбин превращает фибриноген в фибрин.

Профилактика послеоперационных осложнений, связанных с кровотечением




Области хирургии, в которых применяется Тахокомб®:

Абдоминальная хирургия



Нейрохирургия



Торакальная хирургия




Сердечно-сосудистая хирургия



Акушерство и Гинекология



Урология




Применение Тахокомба после операции Кесарево сечение

Рибофлавин



Чел
5,5
Чел
2 М

онский
оллаген




Применение тахокомба® после консервативной миомэктомии

Препарат Тахокомб® использовался после лапароскопического удаления миоматозного узла на передней поверхности.



Применение тахокомба® после консервативной миомэктомии



Применение Тахокомба при удалении миоматозного узла на передней поверхности после кесарево сечение.



Применение тахокомба по поводу разрыва матки

У пациентки в первом триместре беременности произошел разрыв рога матки

Выполнена лапаротомия, резекция и дополнительный гемостаз с помощью Тахокомба®




Применение тахокомба® после перфорации матки

Перфорация матки в результате аборта на сроке 20 недель беременности; Произведено ушивание места перфорации на матке. Шов на матке укрыт пластинкой тахокомб.



Место хирургии в акушерстве и гинекологии.



Симультанная операция у беременной 35 недель беременности. Рак шейки матки.

Кесарево сечение

Расширенная экстирпация матки с придатками

(операция Вертгейма)

Аорто-подвздошно-тазовая лимфаденэктомия

Оперирует: Вученович Ю.Д. Васильченко М.И.

ГКБ №68.

2 года после родов и операции



Благодарю за внимание!

